

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 11.06.2024 08:04:05
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Госпитальная хирургия
 Семестр 9

Код, направление подготовки	31.05.02
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Хирургических болезней
Выпускающая кафедра	Педиатрии

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности и вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите один правильный ответ 1. Для острого аппендицита не характерен симптом: а) Ровзинга; б) Воскресенского, в) Мерфи, г) Образцова, д) Бартомье-Михельсона	1) а. 2) б. 3) в. 4) г. 5) д.	Низкий уровень	2,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите один правильный ответ 2. К перитонеальным симптомам при остром аппендиците относят симптомы: а) Воскресенского (синдром "рубашки"), б) Щеткина-Блюмберга, в) Раздольского, г) все названные симптомы, д) ни один из них.	1) а. 2) б. 3) в. 4) г. 5) д.	Низкий уровень	2,0

ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите один правильный ответ 3. Причиной возникновения острого холецистита чаще всего является:	1. Физическая нагрузка 2. Аномалия развития желчевыводящих путей 3. Нарушение диеты и режима питания 4. Гематогенная инфекция 5. Травма органов брюшной полости	Низкий уровень	2,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите один правильный ответ 4. Ультразвуковой критерий острого холецистита при оценке состояния стенки желчного пузыря:	1. Истончение стенки 2. Кальциноз стенки 3. Утолщение с расслоением стенки 4. Нет специфических критериев.	Низкий уровень	2,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите один правильный ответ 5. Наиболее характерный признак при лабораторной диагностике острого панкреатита:	1. Гиперкалиемия 2. Гиперлейкоцитоз 3. Гиперамилаземия 4. Гиперкоагулемия 5. Анемия	Низкий уровень	2,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите один правильные ответы 6. Хирургическое лечение острого панкреатита не показано при:	1. Отечной форме панкреатита 2. Жировом панкреонекрозе 3. Геморрагическом панкреонекрозе	Средний уровень	5,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите один правильные ответы 7. Основной причиной позднего обращения лиц старческого возраста с острым аппендицитом является:	1. Плохая организация хирургической помощи 2. Скудная симптоматика в связи с низкой реактивностью организма 3. Энцефалопатия	Средний уровень	5,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите один правильные ответы	1. Лигатурный 2. Русанова 3. Аппаратный	Средний уровень	5,0

	8. При выполнении лапароскопической аппендэктомии чаще всего для обработки культи аппендикса используется способ			
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите один правильный ответ 9. Факторы риска возникновения рака молочной железы, кроме:	1. Широкое применение контрацептивов 2. Отягощённая наследственность 3. Травма молочной железы 4. Длительное кормление ребёнка грудью 5. Неоднократное прерывание беременности	Средний уровень	5,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите один правильный ответ 10. Лучшим методом лечения гнойного мастита является:	1. Прекращение лактации 2. Антибиотикотерапия 3. Физиотерапевтическое лечение 4. Рассечение и дренирование гнойника; 5. Сцеживание молока	Средний уровень	5,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите все правильные ответы 11. Методы стерилизации все, кроме:	1. ионизирующего излучения; 2. автоклавирования паром под давлением; 3. воздействия химических антисептиков; 4. горячего воздуха в сухожаровом шкафу; 5. автоклавирования текучим паром.	Средний уровень	5,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите все правильные ответы 12. Основной путь распространения	1. воздушно-капельный; 2. воздушно-пылевой;	Средний уровень	5,0

	госпитальной инфекции:	3. имплантационный; 4. контактный.		
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите все правильные ответы 13. Межфаланговый сустав веретенообразно изменен, тыльная межфаланговая борозда сглажена, движения резко болезненны. Вид панариция:	1. костный; 2. сухожильный; 3. суставной; 4. пандактилит; 5. подкожный.	Средний уровень	5,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите все правильные ответы 14. Вывихнутой считается кость	1. центральная; 2. периферическая	Средний уровень	5,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите все правильные ответы 15. Причиной патологического вывиха может быть все, кроме:	1. костно-суставного туберкулеза; 2. остеомиелита; 3. артроза; 4. артрита; 5. полиомиелита; 6. травматического шока.	Средний уровень	5,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите все правильные ответы 16. По инфицированности выделяют раны?	1. гнойные, асептические, отравленные; 2. асептические, скальпированные, гнойные; 3. укушенные, свежеинфицированные, асептические; 4. чистые, свежеинфицированные, зараженные; 5. гнойные свежеинфицированные, асептические	Высокий уровень	8,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите все правильные ответы 17. Какая операция не выполняется в ранние сроки при остром остеомиелите?	1. вскрытие флегмоны; 2. рассечение надкостницы; 3. трепанация костно-	Высокий уровень	8,0

		мозговой полости; 4. секвестрэктоми я; 5. костная пластика.		
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите все правильные ответы 18. Чем опасны фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, носа и суборбитальной области?:	1. отеком лица 2. развитием паротита 3. развитием гнойного базального менингита 4. носовым кровотечением	Высокий уровень	8,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите все правильные ответы 19. К возбудителям хирургического сепсиса не относятся:	1. кишечная палочка; 2. гемолитический стрептококк: 3. золотистый стафилококк: 4. протей: 5. синегнойная палочка.	Высокий уровень	8,0
ОПК-9, ПК-6, ПК-8	Укажите все правильные ответы 20. Флегмона – это острое разлитое воспаление	1. полости сустава 2. плевральной полости 3. брюшной полости 4. клетчаточного пространства	Высокий уровень	8,0