

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 26.05.2026 13:39:07
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

«Вероятность и статистика»

Квалификация выпускника	бакалавр
Направление подготовки	38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль)	Аналитика управления бизнес процессами
Форма обучения	очная
Кафедра- разработчик Выпускающая кафедра	Прикладной математики Менеджмента и бизнеса

Проверяемые компетенции	Задание	Варианты ответов	Тип сложности
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 1. Выбрать один правильный ответ. Число перестановок множества из n элементов определяется по формуле ...	1) $n!$ $\frac{n(n+1)}{2}$ 2) $\frac{n!}{(n-1)!}$ 3) 2^n 4)	низкий
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 2. Выбрать один правильный ответ. Число размещений из n элементов по k определяется по формуле ...	1) $n!$ $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ 2) $\frac{n!}{(n-k)!}$ 3) k^n 4)	низкий
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 3. Выбрать один правильный ответ. Число сочетаний из n элементов по k определяется по формуле ...	1) $n!$ $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ 2) $\frac{n!}{(n-k)!}$ 3) k^n 4)	низкий
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 4. Указать количество элементов, образующих пространство элементарных событий при бросании монеты.	—	высокий
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 5. Указать количество элементов, образующих пространство элементарных событий при бросании игральной кости.	—	высокий
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 6. Выбрать один правильный ответ. Указать событие, которое считается невозможным при бросании игральной кости на ровную	1) Выпало число 1. 2) Выпало чётное число.	средний

	поверхность.	3) Выпало число меньше 7. 4) Кость встала на вершину.	
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 7. Указать чему равна вероятность выпадения герба при бросании монеты.	—	средний
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 8. Выбрать верное название формулы для иллюстрирующей связь событий A и B с $P(B) \neq 0$.	$P(A B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ <ul style="list-style-type: none"> 1) Условие независимости двух событий. 2) Формула полной вероятности. 3) Формула Байеса. 4) Формула условной вероятности. 	средний
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 9. Вставить пропущенный термин. Пусть функция распределения случайной величины X нам неизвестна, но мы располагаем случайной выборкой $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$. По наблюдениям выборки \vec{X} мы хотим дать ответ на вопрос: совпадает функция распределения $F(x)$ с некоторой наперед заданной функцией распределения $F_0(x)$ или нет. При такой постановке задачи говорят, что речь идет о ...	<ul style="list-style-type: none"> 1) проверке статистической гипотезы 2) эффективной оценке 3) асимптотически эффективной оценке 4) статистическом критерии 	средний
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 10. Выбрать верное название для формулы $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A H_i)$, где $H_i, i=1, \dots, n$, – полная группа событий и $P(H_i) > 0$.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Формула полной вероятности. 2) Формула Байеса. 3) Формула условной вероятности. 4) Формула Бернулли 	средний
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 11. Вставить пропущенный термин. При решении практических задач вместо оценки неизвестного параметра распределения случайной величины важнее знать границы, в которых этот параметр находится. Эти границы строятся по выборке и образуют ...	<ul style="list-style-type: none"> 1) доверительный интервал 2) эффективную оценку 3) асимптотически эффективную оценку 4) статистический критерий 	средний
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 12. Выбрать верное название для формулы $P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}$, где	<ul style="list-style-type: none"> 1) Формула полной вероятности. 	высокий

	$P_n(m)$ означает вероятность наступления некоторого события A m раз в n испытаниях, а P – вероятность наступления события A в одном испытании, а q – вероятность наступления дополнительного к A события в одном испытании	2) Формула Байеса. 3) Формула условной вероятности. 4) Формула Бернулли	
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 13. Выбрать один правильный ответ. При большом числе испытаний пользоваться формулой Бернулли неудобно, в таком случае пользуются приближенной формулой, фигурирующей в ...	1) локальной теореме Муавра-Лапласа 2) интегральной теореме Муавра-Лапласа 3) теореме Пуассона 4) теореме Пирсона	высокий
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 14. Выбрать один правильный ответ. Выборочным средним называется выражение ...	1) $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 2) $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ 3) $\bar{X}_n^{(k)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 4) $S_n^{(k)} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^k$	средний
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 15. Выбрать один правильный ответ. Соответствие, которое каждому значению x_i дискретной случайной величины X сопоставляет его вероятность P_i , называется ...	1) законом распределения 2) плотностью распределения 3) математическим ожиданием 4) случайной величиной	низкий
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 16. Выбрать один правильный ответ. Функция $F(x) = P(X < x)$, $x \in (-\infty, \infty)$, называется ... случайной величины X .	1) функцией распределения 2) плотностью распределения 3) математическим ожиданием 4) дисперсией	низкий
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	№ 17. Выбрать один правильный ответ. Если существует такая	1) законом распределения 2) плотностью распределения	средний

	<p>неотрицательная функция $f(x)$, что функция распределения $F(x)$</p> <p>для каждого $x \in (-\infty, \infty)$ представима в виде $F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$, то $f(x)$ называется ... случайной величины X.</p>	<p>3) математическим ожиданием</p> <p>4) дисперсией</p>	
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	<p>№ 18. Выбрать один правильный ответ. Выражение $M(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$ называется ... дискретной случайной величины X.</p>	<p>1) ковариацией</p> <p>2) средним квадратическим отклонением</p> <p>3) математическим ожиданием</p> <p>4) дисперсией</p>	средний
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	<p>№ 19. Выбрать один правильный ответ. Выражение $D(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(X))^2 p_i$ называется ... дискретной случайной величины X.</p>	<p>1) ковариацией</p> <p>2) средним квадратическим отклонением</p> <p>3) математическим ожиданием</p> <p>4) дисперсией</p>	средний
УК-1.3 УК- 1.4 ОПК-4.1 ОПК-4.2	<p>№ 20. Выбрать один правильный ответ. Выражение $\text{cov}(X, Y) = M((X - M(X))(Y - M(Y)))$ называется ... двух случайных величин X и Y.</p>	<p>1) ковариацией</p> <p>2) средним квадратическим отклонением</p> <p>3) математическим ожиданием</p> <p>4) дисперсией</p>	высокий